

Anthrax

โรคแอนแทรกซ์

อาการ

- 01 มีไข้
- 02 คลื่นไส้ อาเจียน
- 03 ปวดท้องรุนแรง
- 04 มีแผลคล้ายบุหรี่จี้
- 05 หายใจขัด หายใจลำบาก

“หากมีอาการรุนแรง
มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 80”

การป้องกัน

-  หลีกเลี่ยงการสัมผัส โค กระบือ แพะ แกะ
-  ล้างมือ ซ้ำระล้างร่างกาย หลังสัมผัสสัตว์
-  เลือกบริโภคเนื้อสัตว์ ที่ได้รับการรับรอง อาหารปลอดภัย
-  หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
-  หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์



Anthrax

โรคแอนแทรกซ์

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในดิน น้ำ และวัสดุจากพืช สัตว์ เชื้อทนความร้อน และเย็นได้ดี สามารถอยู่ในดินได้นานกว่า 10 ปี

การติดต่อ

 การรับประทานเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อ

 การสัมผัสสัตว์ ที่ป่วย หรือตายผิดปกติ

 ติดจากการหายใจ ฝุ่นดินที่มีสปอร์เชื้อเข้าไป

 สัตว์พาหะหลัก คือ โค กระบือ แพะ แกะ

ระยะฟักตัว

ระยะฟักตัวของโรค 1- 5 วัน หรืออาจนานถึง 60 วัน

